Reunión Territorial SEAP

Hospital Infanta Leonor

30 de Mayo de 2008

- Varón de 39 años con lesión en conjuntiva bulbar de varios meses de evolución.
- Lesión sobreelevada con marcada vascularización periférica






















EMA


CD 20


CD 20


CD 43


CD 43







S-100


S-100

Nevus melanocítico conjuntival de tipo juvenil, variante “linfocito-like”

Nevus melanocítico conjuntival

- Los nevus melanocíticos de conjuntiva tienen peculiaridades histológicas
- Rasgos distintivos:
  - quistes epiteliales
  - nidos confluentes de melanocitos
  - denso infiltrado linfocitario.

Nevus melanocítico conjuntival

- Componente de unión ocupa la basal, con adelgazamiento del epitelio.
- Células con grandes núcleos hipercromáticos y escaso citoplasma.
- Grandes masas de melanocitos subepiteliales y de unión.




NJOPH.com

Nevus melanocitico conjuntival juvenil

- Patrón crecimiento confluente en nidos
- Discohesión de nidos intraepiteliales
- Aparente falta de maduración (invertida o incompleta)
- Fenómeno en hombrera
- Quistes epiteliales
- Respuesta linfocitica

Thiagalingam, S. Juvenile Conjunctival Nevus: Clinicopathologic Analysis of 33 Cases Am J Surg Pathol. 2008;32:399-406.

Nevus melanocitico conjuntival juvenil

- Tipo A: melanocitos epitelioides
- Tipo B: melanocitos linfocitos- like
- Tipo C: melanocitos fusiformes
- Formas mixtas

Problemas diagnósticos

Patrón histológico atípico,
que en la piel,
haría pensar en un melanoma

Nevus

- Gente joven
- Conjuntiva bulbar o limbar
- Ausencia de mitosis
- Densamente celular
- Buena circunscripción de nidos
- Quistes (50-80%)

Melanoma

- Mayores 50 años
- Conjuntiva palpebral o fornix
- Presencia de mitosis
- Melanina en zonas profundas
- Mala circunscripción lateral y profunda
- No hay quistes *(salvo nevus preexistente)*

Nevus

- Gente joven
- Conjuntiva bulbar o limbar
- Ausencia de mitosis
- Densamente celular
- **Buena circunscripción de nidos**
- **Quistes (50-80%)**

Melanoma

- Mayores 50 años
- **Conjuntiva palpebral** o fornix
- Presencia de mitosis
- Melanina en zonas profundas
- Mala circunscripción lateral y profunda
- No hay quistes *(salvo nevus preexistente)*

NEVUS DE LOCALIZACON ESPECIAL

- Edad
- Localizacion: conjuntiva bulbar
- Patrón de crecimiento
- Quistes



NEVUS CONJUNTIVAL JUVENIL

Bibliografia

- Thiagalingam, S. Johnson, M. Colby, K.; Zembowicz, Juvenile Conjunctival Nevus: Clinicopathologic Analysis of 33 Cases. Am J Surg Pathol. 2008;32:399-406.
- Shields CL, Demirci H, Karatza E, et al. Clinical survey of 1643 melanocytic and nonmelanocytic conjunctival tumors. Ophthalmology. 2004;111:1747–1754
- Zamir E, Mechoulam H, Micera A, et al. Inflamed juvenile conjunctival naevus: clinicopathological characterisation. Br J Ophthalmol. 2002;86:28–30.
- Sugiura M, Colby KA, Mihm MC Jr, et al. Low-risk and high-risk histologic features in conjunctival primary acquired melanosis with atypia: clinicopathologic analysis of 29 cases. Am J Surg Pathol. 2007;31:185–192.
- Shields CL, Fasiuddin AF, Mashayekhi A, et al. Conjunctival nevi: clinical features and natural course in 410 consecutive patients. Arch Ophthalmol. 2004;122:167–175.